Collections recueillies dans le Sahara et les régions voisines par M. René Chudeau (1).

Coléoptères : Cicindélides (déterminés par M. Flettiaux).

I. Récoltes de M. Ghudeau (Sahara).

Cicindela melancholica Fabr. (3 spéc.). — Tanianghasset, Août 1905.

H. Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Cicindela melancrolica Fabr. (1 spéc.). — Koulikoro. Cicindela vigina Doj. (1 spéc.). — Koulikoro. Megacephala senegalensis Latr. (3 spéc.). — Koulikoro.

Staphylinides (déterminés par M. A. FAUVEL).

Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Philontus cupreonitens Epp. (1 spéc.). — Koulikoro, Philontus Marithus Môts. (1 spéc.). — Koulikoro, Zyras triangulatus of Fyl. (1 spéc.). — Koulikoro, Bledius speculicollis Fyl. (1 spéc.). — Koulikoro, Bledius rufiventris Fyl. (2 spéc.). — Koulikoro, Ovytelus dilutipennis Fyl. (6 spéc.). — Koulikoro,

Nitidulides (déterminés par M. A. Grouvelle).

Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Lasiodactylus subproductus Reitt. (1 spéc.). — Koulikoro. Æthinopa fulvovestita Reitt. (9 spéc.). — Koulikoro. Æthinopa fulvovestita Reitt. var. minor (1 spéc.). — Koulikoro.

Coccinellides (déterminés par M. le D' Sicard).

1. Récoltes de M. Chedeau (Sahara).

Ephlachia curysomelina Fabr. (5 spéc.). — Oued Kademaflet. Septembre 1905.

Epilachna chrysomelina var. reticulata Ol. (13 spéc.). — Kaohara, N' Guigmi, Sud de l'Aïr, 1905, et Ségou, octobre 1906.

⁽¹⁾ Aux listes ci-dessous, ont été jointes celles des Coléoptères récoltés dans le Soudan français par M. Keisser. Les itinéraires de M. Chudeau ont paru en 2 feuilles à 1/1,250,000° dans La Géographie, 1907.

Adonia variegata Sajo (3 spéc.). — Tamanghasset. Août 1905. Exochomus nigripennis Er. (2 spéc.). — Tagaina. Novembre 1905.

II. Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Cydonia Lunata Fabr. (3 spéc.). — Koulikoro.

Cyponia vicina Muls. (5 spéc.). — Koulikoro.

Adonia variegata Sajo var. confluens Sajo (1 spéc.). — Koulikoro.

Exochomus nigromaculatus Sajo var. Troberti Muls. (1 spéc.). — Koulikoro.

Chnootriba assimilis Muls. (1 spéc.). — Koulikoro.

Malacodermes (déterminés par M. Bourgeois).

1. Récoltes de M. Chudeau.

Laciola tetrasticta of Fairm. (1 spéc.). — Koulikoro, novembre 1906. La puissance lumineuse de cette espèce est très développée. Voici ce que dit M. Chudeau à ce sujet : «Quand l'insecte est enfermé dans une boîte à parois minces, dans une boîte à allumettes suédoises par exemple, la lumière intense qu'il produit est visible à travers les parois. Cette lumière est reite.»

H. Récoltes de M. Keissen (Sondan).

Silis senegalensis & Cast. (Hist. Ins., 1. p. 271) [1 spéc.]. — Koulikoro.

Melyris abdominalis Fabr. (12 spéc.). — Koulikoro.

Melyris elongata Pic (Le Naturaliste, 1897, p. 124) [3 spéc.]. — Koulikoro.

PSILOTURIX PLUMBEUS Schilsky (D. E. Z., 1895, p. 164) [2 spéc.]. — Koulikoro.

Elatérides (déterminés par M. Fleutiaux).

I. Récoltes de M. Chudeau (Sahara).

Tetralobus natalensis Cand (1 spéc.). — Sahara; sans désignation de localité.

AGRYPNUS NOTODONTA Latr. (1 spéc.). — Kaouara, 22 mai 1906. AGRYPNUS FALLACIOSUS Fairm. (1 spéc.). — Amonkay, 28 mai 1906. Melanotus umbilicatus Gyll. (1 spéc.). — Amonkay, 28 mai 1906.

II. Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Agrypnus puber Cand. (5 spéc.). — Koulikoro. Digronychus serraticornis Cast. (4 spéc.). — Konlikoro. Psephus guineensis Cand. (2 spéc.). — Koulikoro. Melanotus umbilicatus Gyll. (2 spéc.). — Koulikoro. Lacon foedus (1 spéc.). — Koulikoro. Heteroderes sp. sp.? (3 spéc.). — Koulikoro. Psephus sp.? (1 spéc.). — Koulikoro.

Buprestides (déterminés par M. Kerrewans).

I. Récoltes de M. Chudeau (Sahara).

Sternocera castanea Olivier (2 spéc.). — Oned Zazir, novembre

1905; Agadès, 30 octobre 1905.

Sternocera interrupta Olivier (Cette espèce se tient ordinairement sur une Combrétacée dont le nom local est Golobai et dont les feuilles sont utilisées en infusion contre la fièvre bilieuse hématurique.) (2 spéc.). — Tagama, 2 décembre 1905.

Julodis fimbriata Klug. (6 spéc.). — Oued Igharghar (celui du Sud). 5 septembre 1905; Tassili de l'Oued Tagrira, septembre 1905; Agadès,

octobre 1905.

Julions Equinoctives Officer (6 spéc.). — Tamanghasset, août 1905: Tit, août 1905: Oued Kademallet, septembre 1905.

Steraspis speciosa Klug. († spéc.). — Djadjidouna, novembre 1905. Sphenoptera dongalensis Klug. († spéc.). — Bohza, juin 1906.

II. Récoltes de M. Keisser (Soudan).

Sternocera interrupta Olivier (1 spéc.). — Koulikoro.

Onthophagides (déterminés par M. H. D'ORBIGNY).

I. Récoltes de M. Chudeau (Sahara).

Onthophagus viridicatus d'Orb. (1 spéc.). — Matankari, juin 1906. Onthophagus bituberculatus Ol. (spéc.). — Tessaona, 21 mai 1906. Onthophagus transcaspicus Kænig. (1 spéc.). — Tamanghasset, août 1906.

II. Récoltes de M. Keisser (Koulikoro-Soudan).

Onthophagus gazella Fabr. (1 spéc.). — Koulikoro. Onthophagus (Phalops) barbicornis Laush. — Koulikoro. Caccobits signaticollis d'Orb. (1 spéc.). — Koulikoro.